



Danoflox[®]

**Antibiótico del grupo de las quinolonas
para uso en Bovinos.**



**Alcanza rápidamente concentraciones terapéuticas
(Niveles en vías respiratorias en menos de 2 horas).**

Potente efecto bactericida.

En la mayoría de los casos se requiere 1 sola dosis.

**En caso que requiera una segunda dosis,
debe ser suministrada a criterio del médico veterinario.**

Marcado efecto post-antibiótico y bactericida absoluto.

ESPECIE



Danoflox®

PRESENTACIONES

Frasco x 20 mL,
50 mL y 100 mL

COMPOSICIÓN

Danofloxacina (Danofloxacina
Mesilata 228,4 mg) 180 mg

DOSIS PRÁCTICA

1 mL de Danoflox para
30 kg de peso vivo.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable.

INDICACIONES

En bovinos como antimicrobiano para el tratamiento de enfermedades causadas por: *Escherichia coli*, *Salmonella dublin*, *Salmonella typhimurium*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, *Pseudomona aeruginosa*, *Klebsiella sp.*, *Enterobacter sp.*, *Corynebacterium bovis*, *Staphylococcus aureus*, *Micrococcus sp.*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovigenitalium*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Mycoplasma synoviae*.

DOSIS FARMACÉUTICA

Bovinos 6 mg/kg

TIEMPO DE RETIRO

En leche: 48 horas.
En carne: 3 días.