



Espiraxin® 600

Antibiótico macrólido de amplio espectro para uso en Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Caninos.



Presentación en solución lista para su uso.

Alcanza altas concentraciones en los sitios de infección.

Antibiótico de amplio espectro.

Alcanza altas concentraciones en glándula mamaria
(Hasta 5 veces la concentración plasmática).

ESPECIE



sanfersaludanimal.co

Línea de antimicrobianos

Espiraxin® 600

PRESENTACIÓN

Frasco x 20 mL,
50 mL, 100 mL y 250 mL

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:
Espiramicina adipato 600.000 U.I

ESPECIE

Bovinos

Porcinos, Ovinos,
Caprinos y
Terneros

Caninos

DOSIS FARMACÉUTICA

30.000 U.I. de espiramicina por
Kg de peso, equivalente a
1 mL por cada 20 Kg de peso.

75.000 U.I. de espiramicina por
cada kilo de peso, equivalente a
1 mL por cada 8 Kg de peso.

75.000 U.I. de espiramicina por
cada kilo de peso, equivalente a
1 mL por cada 8 Kg de peso.

DOSIS PRÁCTICA

1 mL por cada 20 kilos
de peso. 5 mL por cada 100
kilos de peso corporal.

1 mL por cada 8 kilos
de peso. 5 mL por cada
40 kilos de peso corporal.

0,125 mL por kilo de
peso. 1 mL por cada
8 kilos de peso corporal.

INDICACIONES

En bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y caninos para el tratamiento de infecciones causadas por *Corynebacterium sp.*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Proteus sp.*, *Klebsiella spp.* y *Mycoplasma sp.*

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable.

TIEMPO DE RETIRO

En leche: 72 horas.
En carne: 72 horas.