



Mirrapel[®]

Advanced 300 g y 600 g

Efectiva fórmula nutricional con desodorizador natural, que ayuda a mantener la buena salud del pelo y piel de tu mascota.



Controla la caída del pelo.

Mascotas saludables y vitales.

Disminuye el olor de las heces.

Regenera y mejora la calidad y fortaleza del pelo.

Protege el hígado.

ESPECIE



sanfersaludanimal.co

Línea de multivitamínicos

Mirrapel®

Advanced 300 g y 600 g

PRESENTACIONES

Mirrapel Advanced x 300 gr
Mirrapel Advanced x 600 gr

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo

INDICACIONES

Mirrapel Advanced es un suplemento alimenticio a base de ácidos grasos insaturados, vitaminas, colina y minerales indicado en las cantidades descritas para perros y gatos de todas las razas y edades a partir de los 21 días de edad.

PRINCIPIO ACTIVO

Cada 1 Kg contiene:
Vitamina A 75400 U.I.
Ácido Linoleico 82000 mg
Ácido Oleico 34600 mg
Vitamina D3 4100 U.I.
Ácido Alfa Linolénico 11000 mg
Colina 6300 mg
Zinc 1650 mg
Vitamina E 500 U.I.
Biotina 2200 mcg
Azufre 800 mg
Niacinamida 225 mg
Vitamina C 220 mg
Pantotenato De Calcio 200 mg
Riboflavina 50 mg
Piridoxina 22 mg

DOSIFICACIÓN PRÁCTICA

ESPECIE	PESO DE LA MASCOTA	CANTIDAD GRAMOS POR DÍA
PERRO	Menos de 10 kg	5 g (1/2 cucharada sopera)
PERRO	Entre 11 y 15 kg	10 g (1 cucharada sopera)
PERRO	Entre 16 y 25 kg	20 g (2 cucharadas soperas)
PERRO	Superior a 25 kg	30 a 60 g (3 a 6 cucharadas soperas)

ESPECIE	PESO DE LA MASCOTA	CANTIDAD GRAMOS POR DÍA
GATO	Menos de 5 kg	5 g (1/2 cucharada sopera)
GATO	Más de 5 kg	10 g (1 cucharada sopera)

Nota: Una cucharada sopera contiene aproximadamente 10 g de producto.

En hembras gestantes y lactantes; perros y perras seniles o convalecientes, en entrenamiento deportivo o con actividad física intensa: aumentar las cantidades mencionadas entre una tercera parte y la mitad. La cantidad total diaria puede suministrarse en una sola vez o fraccionándola a lo largo del día en dos o tres porciones y puede ser modificada a criterio del médico veterinario aumentándola aún más si es necesario.

Suministre mínimo durante 2 a 3 meses continuos o según lo indique el médico veterinario.