



# Mirrapel<sup>®</sup>

Senior 120 mL y 236 mL

**Fórmula avanzada que ayuda a mantener la vitalidad diaria de tu mascota**



**Controla la caída del pelo.**

**Estimula el sistema inmunológico y la función cerebral.**

**Reduce el mal olor a sebo rancio de la piel.**

**Mejora la movilidad de la mascota y su calidad de vida.**

**Suministra protección antioxidante.**

**Previene la inflamación y el dolor articular.**

**ESPECIE**



sanfersaludanimal.co

**Línea de multivitamínicos**

# Mirrapel®

Senior 120 mL y 236 mL

## PRESENTACIONES

Mirrapel Senior x 120 mL  
Mirrapel Senior x 236 mL

## FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión

## INDICACIONES

Mirrapel Senior es un suplemento nutricional a base de ácidos grasos insaturados, glucosamina, condroitina, vitaminas y minerales para perros y gatos.

## PRINCIPIO ACTIVO

Cada 100 mL contiene:

Vitamina A .....	30000 U.I.
Ácido Linoleico .....	24500 mg
Ácido Oleico .....	11000 mg
Vitamina D3 .....	1600 U.I.
Ácido Alfa Linolénico .....	2900 mg
Glucosamina Sulfato.....	2200 mg
Condroitina Sulfato .....	1800 mg
Zinc .....	400 mg
Vitamina E .....	400 U.I.
Ácido Araquidónico .....	55 mg
Biotina .....	700 mcg
Ácido Docosahexaenoico (DHA).....	630 mg
Ácido Eicosapentaenoico (EPA).....	400 mg
D-Pantenol.....	80 mg
Ácido Docosapentaenoico (DPA).....	55 mg
Piridoxina.....	9 mg

## DOSIFICACIÓN PRÁCTICA

RAZAS	PESO DE LA MASCOTA	CANTIDAD MILILITROS POR TOMA DIARIA
GIGANTES	Superior a 50 kg	14
GRANDES	Desde 25 a 50 kg	7
MEDIANAS	Desde 14 a 25 kg	5
PEQUEÑAS	Desde 5 a 14 kg	3
TOYS	Menos de 5 kg	1

## DOSIS BÁSICA APROBADA

Perros: 1 mL por cada 4 kg de peso vivo.

Hembras en gestación o lactancia: 1,3 mL por cada 4 kg de peso vivo.

Gatos: 0,2 mL por cada 1 kg de peso vivo o 0,8 mL por cada 4 kg de peso vivo.

Hembras en gestación o lactancia: 0,25 mL por cada 1 kg de peso vivo o 1 mL por cada 4 kg de peso vivo.

Las cantidades totales pueden suministrarse en una sola vez o fraccionándolas a lo largo del día en dos o tres porciones y pueden ser modificadas a criterio del médico veterinario.

Suministre mínimo durante 2 a 3 meses continuos o según lo indique el médico veterinario.