



Ranidin® V

Es un antagonista de los receptores H₂ que inhibe la secreción de ácido clorhídrico en las células parietales del estómago y promueve el vaciamiento gástrico, gracias a su marcado efecto procinético.



Primera Ranitidina inyectable para uso veterinario en Colombia.

Alta eficacia en el control de la acidez gástrica.

Tiene marcado efecto procinético que favorece el vaciado gástrico.

Prácticas presentación en frasco vial de 20 mL.

ESPECIE



sanfersaludanimal.co

Línea de gastroprocinéticos

Ranidin® V

PRESENTACIONES

Frasco solución Inyectable x 20 mL

COMPOSICIÓN

Cada mL de la solución inyectable contiene:
Ranitidina Clorhidrato (Equivalente a 25 mg
de ranitidina base) 27,9 mg

ESPECIE	DOSIS FARMACÉUTICA	DOSIS PRÁCTICA	TIEMPO/DOSIS
Perros y Gatos	1 - 2 mg/kg.	1 mL por cada 12,5-25 kg.	8 a 12 horas.
Caballos	15 mg/kg.	1 mL por cada 12,5 - 16 kg	6 a 8 horas.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable

INDICACIONES

Indicado en perros, caballos y gatos para el tratamiento y/o profilaxis de úlceras gástricas y duodenales, gastritis urémica o inducida por medicamentos, gastritis erosiva relacionada con el estrés, esofagitis, reflujo gástrico y duodenal, reflujo esofágico. Para tratamiento de condiciones hipersecretoras asociadas con gastrinomas y mastocitosis sistémica. Puede utilizarse para promover el vaciado gástrico, particularmente cuando está asociado con enfermedad gástrica ulcerativa.